



## SPIROMETRIJA

### Što je spirometrija?

Spirometrija je osnovni test za ispitivanje plućne funkcije. Spirometrijom možemo dokazati jesu li Vaše smetnje povezane s plućnim bolestima ili je uzrok druge prirode (npr. bolesti srca, psihički poremećaj i sl.). Spirometrija je bezbolna metoda kod čijeg izvođenja je vrlo važna suradnja pacijenta te pravilna tehnika.

### Kada trebate spirometriju?

Spirometriju trebate ako ste pušač, ako imate tegoba s disanjem u mirovanju ili naporu, ako imate noćna gušenja, osjećaj piskanja u prsim ili uporni kašalj. Nalaz spirometrije zajedno s nalazima drugih dijagnostičkih metoda (RTG pluća i srca, fizikalni pregled, krvni nalazi) doprinosi postavljanju konačne dijagnoze i donošenje odluke o dalnjem liječenju.

### Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema. Ukoliko ste već radili spirometriju, potrebno je donijeti ranije nalaze radi usporedbe. U nekim slučajevima pretragu ne savjetujemo ili je odgađamo za kasnije, primjerice pri povraćanju, slabosti, vrtoglavici, krvavome ispljuvku, neposredno nakon operacije očiju, kirurških zahvata u trbušnoj i/ili prsnoj šupljini, poslije nedavno preboljena infarkta srca, kod angine pectoris.

### Kako se pretraga odvija?

Pretraga se obavlja ambulantno i nije potreban prijem u bolnicu. Tijekom pretrage sjedite. Pretragu izvodi primjereno educirana medicinska sestra ili zdravstveni tehničar. Dobit

ćete upute da zrak svom snagom udahnete, a potom sav zrak iz pluća izdahnete u usnik spiometra. Aparat će na papiru iscrtati krivulje vašega izdisaja koje omogućuju ocjenjivanje vaše plućne funkcije (ukupne zapremine pluća, tj. vitalne kapacitete, brzinu izdahnutoga zraka te moguće smetnje – npr. suženje dišnih putova kod astme, kronični pušački bronhitis itd). Nalaz pretrage uvijek ocijeni i objasni liječnik. Katkada se s obzirom na nalaz spiometrije liječnik odlučuje za još dodatni test, tzv. provokacijski ili bronhodilatacijski. Pri provokacijskom testu se dokazuje hiperreaktivnost bronha.

### **Koliko traje spiometrija?**

Spiometrija traje nekoliko minuta. Bronhodilatacijski test produžuje pretragu za približno 20 minuta.

### **Kakve neugodnosti možete očekivati?**

Sama spiometrija je bezbolna i ne uzrokuje nikakve posljedice. Katkad se tijekom pretrage ili poslije nje, zbog forsiranoga disanja javlja kratkotrajni nadražajni kašalj.